

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігіПриказ Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
здравоохранения от 18 апреля
2000 года N 225. Зарегистрирован
Министерством юстиции
Республики Казахстан 24 мая 2000
года N 1138. Утратил силу
приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2004 года
№ 876 (вступает в силу со дня его
официального опубликования)Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

Об утверждении состава аптечки первой помощи (автотранспортной)

Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 20.12.2004 № 876 (вступает в силу со дня его официального опубликования).

В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года N 1650 "Об утверждении Правил дорожного движения Республики Казахстан", снижения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, своевременного оказания само- и взаимопомощи участниками дорожно-транспортного происшествия, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
 - 1) Состав аптечки первой помощи (автотранспортной);
 - 2) Инструкцию по применению лекарственных средств аптечки первой помощи (автотранспортной) и оказанию само- и взаимопомощи участниками дорожно-транспортного происшествия.
2. Считать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан от 02 апреля 1999 года N 172 "Об утверждении состава аптечки первой помощи (транспортной)".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Ибраева С.Е.



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

Председатель

Утвержден
приказом Агентства
Республики Казахстан
по делам здравоохранения
от 18 апреля 2000 года N 225

Состав аптечки первой помощи (автотранспортной)

N п/п	Наименование	количество
Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые лекарственные средства, применяемые при травмах (ушибы, переломы, вывихи, ожоги), ранениях, шоке		
1)	анальгин 0,5 N 10	1 уп.
2)	ацетилсалициловая кислота (аспирин) 0,5 N 10	1 уп.
3)	сульфацила натрия раствор 30 % - 5,0 (глазные капли)	1 фл.
Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран		
4)	жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха	1 шт.
5)	бинт стерильный 10X5	1 шт.
6)	бинт не стерильный 10X5	1 шт.
7)	бинт не стерильный 5X5	1 шт.
8)	повязка стерильная ватно-марлевая 65X43	1 шт.
9)	лейкопластырь бактерицидный 2,5X7,2 или 6X10	4 шт.
10)	салфетки марлевые стерильные	2 уп.
11)	раствор йода спиртовой 5% или раствор бриллиантовой зелени 1%	1 фл.
12)	лейкопластырь медицинский 1X500 или 2X500 или 1X250	1 шт.
13)	бинт эластичный трубчатый медицинский N 1,3,6	по 1 шт.
14)	вата гигроскопическая нестерильная 50 гр.	1 шт.
15)	перексид водорода раствор 3% (или гидроперит - 1 уп.)	1 фл.
Средства при болях в сердце		
16)	нитроглицерин табл. N 40 или капс. N 20 (тринитролонг)	1 уп.
17)	валидол таблетки или капсулы	1 уп.
Средства при обмороке (коллапсе)		
18)	аммиака раствор 10% (нашатырный спирт) - во флаконах или ампулах	1 уп.
Средства при отравлениях пищей		
19)	уголь активированный N 10	2 уп.
Средства при стрессовых реакциях		
20)	корвалол	1 фл.

Примечание:

лекарственные средства хранятся в футляре.

К аптечке первой помощи (автотранспортной) прилагаются стаканчик для приема лекарств и Инструкция по применению лекарственных средств и оказанию само- и взаимопомощи.

Не допускается произвольная замена указанных в перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения и применение лекарственных

средств с поврежденной маркировкой и истекшим сроком годности.
Аптечка первой помощи (автотранспортная) подлежит своевременному
пополнению.

Утверждена
приказом Агентства
Республики Казахстан
по делам здравоохранения
от 18 апреля 2000 года N 225

**Инструкция по применению лекарственных средств аптечки первой помощи
(автотранспортной) и оказанию само- и взаимопомощи участниками
дорожно-транспортного происшествия**

1. Травма: ушибы, переломы, вывихи

При травмах дают обезболивающее средство (анальгин), иммобилизируют конечность (шинами, подручными средствами, или фиксируют руку к туловищу, ногу к ноге), накладывают холод на место травмы.

2. Раны и кровотечения

При артериальном кровотечении (кровь алая, вытекает пульсирующей струей) - наложить жгут выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, наложить на рану повязку. Конечность иммобилизовать, больному дать обезболивающее средство (анальгин).

При венозном кровотечении (кровь темная не пульсирует) - наложить на рану салфетку стерильную и сделать давящую повязку бинтом.

При капиллярном кровотечении - на рану наложить стерильную повязку, дать обезболивающее средство (анальгин). Мелкие раны и ссадины обработать раствором бриллиантовой зелени, йода или перекиси водорода, заклеить бактерицидным пластырем.

3. Ожоги

При обширных ожогах наложить стерильную повязку, дать обезболивающее средство (анальгин). Выпить стакан щелочной воды.

4. Боли в сердце

При болях в сердце положить нитроглицерин или валидол одну таблетку под язык или выпить 15-20 капель корвалола в 50 мл воды.

5. Обморок

При обмороке положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный спирт на ватке.

6. Стрессовые реакции

При стрессовой реакции развести 30 капель корвалола в 50 мл воды и дать выпить больному.

7. Сердечно-легочная реанимация

Сердечно-легочная реанимация проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на сонной артерии путем непрямого массажа сердца и искусственного дыхания "рот в рот" до прибытия медработника или восстановления дыхания и пульса.

8. Отравления

При отравлении промыть желудок. Дать принять 2-3 таблетки активированного угля.

9. Поражение глаз

При попадании в глаза инородных тел и веществ или травме глаз необходимо глаза промыть водой, закапать 2-3 капли сульфацила натрия.